

Principios astrológicos y Casas fotoeclipticas

Demetrio Santos

1.- La presente investigación empezó cuando, hacia 1.952, me hallaba comprobando los puntos de crisis vitales mediante el ciclo de 60 años y su vector direccional ($T = 58,26$ años).

El método es bueno para seguir la evolución del hombre, dirigiendo el vector del ciclo a partir del Ascendente a una velocidad de 6° por año. El período compuesto Júpiter/Saturno se refuerza con otros coincidentes, como el de los biorritmos, otro de la Luna y diversos armónicos de otros planetas. Su mayor importancia sobre el hombre es debida a que tiene resonancia con la duración media de la vida humana¹; así, vemos mencionado en *Gén.* 6.3 los 120 años de vida máxima, y éste (años lunares) corresponde al segundo armónico del citado. A partir del Ascendente astronómico en su movimiento, se observa que las crisis se adelantan alrededor de un año, es decir, 6° para la latitud de España (40° N).

El dato segundo vino de las estadísticas publicadas por Michel Gauquelin en 1.955, donde se ve un desvío estadístico de $8^\circ / 10^\circ$ del máximo sobre el Ascendente, cuando deberían coincidir según los autores clásicos (Junctino y otros). Ver Fig. 1.




Figura 1

En ambos casos podría achacarse el desvío a un error en la hora de nacimiento, que se habría apuntado más tarde de la verdadera. Pero, precisando más, y utilizando las fechas de nacimiento con seguridad de uno varios minutos de error máximo, hay que desechar esta explicación, y subsiste, sin embargo, el indicado desvío.

¹ Ciclos o períodos no se pueden elegir arbitrariamente. Deben responder a influencias físicas (cósmicas) desde el exterior, puesto que el organismo ha sido formado, y se ha adaptado al ambiente donde vive.

El tercer dato se apoya en el animodar de **Ptolomeo** (*Tetrabiblos* III, 12), que dice que el punto más importante o intenso del horóscopo ha de coincidir o aspectar al Ascendente. Como no ocurre así, Ptolomeo recomienda un desvío sistemático de la cúspide de la 1ª Casa de -5° , asumiendo que tiene dicho error, aunque no explica por qué. Esto es válido seguramente para Alejandría y el Oriente Medio, de donde provenían los datos. La doctrina, propagada por **Pablo de Alejandría** (ca. 380), **Ben Ragel** (ca. 1.030) y otros, es corregida por **Demófilo** (ca. 200), que recomienda, en vez de los -5° , el valor de $1/6$ de la extensión de la Casa 12ª.

Tal corrección fue olvidándose, aunque proseguían los errores, sin duda, que luego **Juan de Gerson** (ca. 1.420), intuyendo el efecto atmosférico, atribuyó a la refracción, lo cual está equivocado, puesto que su desvío máximo no supera el medio grado.

2.- En un principio creí que el error podía deberse al hecho de que los nacimientos tienen lugar por lo general en poblaciones que normalmente ocupan los valles fértiles o lugares bajos del terreno, por lo que el horizonte “físico” o real se halla por encima del teórico que nos dan las Tablas².

Pero esto, aparte de que los valores son bajos y no llegan a los errores que se comprueban experimentalmente, mucho menos nos explicarían el gradual aumento que se observa a medida que crece la Latitud geográfica. En efecto, son -5° para Egipto, $-6^\circ/-7^\circ$ para España y $-8^\circ/-10^\circ$ para las muestras de Gauquelin, procedentes en su mayoría de la Europa de 50° de Latitud Norte.

La solución vino al observar la orientación de los girasoles. Se cree, generalmente, que éstos van siguiendo el movimiento del Sol. Esto es erróneo, pues, si bien sus hojas, como las de todas las plantas, se orientan de modo que reciben la máxima cantidad de luz, las corolas de la planta adulta miran continuamente al Este. Pero no lo hacen justo al punto del orto solar durante la floración, sino desviadas hacia el Sur algunos grados. Algo debía provenir de esa parte del cielo que las orientaba, pues aquéllas, ubicadas en el interior de ciudades o en calles urbanas o jardines, no mantenían dicha orientación³.

Hice mediciones fotométricas, especialmente en las horas próximas al orto y al ocaso del Sol (cada 2 minutos, en cielo despejado y homogéneo) y mediante las transformaciones pertinentes de coordenadas, resultó que al punto al que se orientaban es el del máximo gradiente de la radiación

² La estrella tarda en verse unos 10 o 20 minutos después de salir por el horizonte astronómico ($2,5^\circ$ a 5°), al ser absorbida su luz por la atmósfera.

³ En regiones tropicales, la “talija” (una especie de acacia) orienta su copa plana al cénit.

luminosa-calorífica que llega al suelo, debido al efecto de absorción de la atmósfera para esa radiación⁴.

Sin duda que esta es la clave que andaba buscando y podía explicar las observaciones. De acuerdo con ello se establecen las correspondientes curvas.

3.- La causa del error del Ascendente tradicional consiste en suponer que la máxima actividad del astro (máximo contraste o gradiente) tiene lugar justamente al orto, que es cuando activa más intensamente al ser vivo, y que por ello se establece aquí el origen del Sistema de Casas.

Pero, como se ve por las mediciones fotométricas, esto no es verdad, sino que dicho máximo está desviado verticalmente unos 4,5° (curva C. A. N.) después de la salida del astro por el Horizonte. Esto es fácil de colegir, por cuanto al orto la masa de la atmósfera que el rayo atraviesa es máxima, y es máximamente absorbida, disminuyendo a medida que va ascendiendo (el Sol mismo puede verse directamente al orto y al ocaso).




Figura 2

De acuerdo con lo anterior, y debido a la selección de las distintas longitudes de onda que hace la atmósfera, cada una (color) tiene su máximo gradiente a distinta altura, siendo de 4,5° para el espectro de la luz visible normal. La clorofila tiene resonancia en los 680 nm (rojo-naranja), de ahí que los girasoles se desvíen unos 19° horizontalmente hacia el Sur. El hombre, cuya sintonía visual se centra en los 557 nm (verde) experimentará un menor desvío, por ser menos absorbido su espectro.

⁴ No hay estudios fotométricos completos tomados en el suelo (algunos actuales realizados en la Antártida, otros en sanatorios médicos). Los nuestros se tomaron sobre la radiación Rayleigh del cénit local (cénit = luz ; nadir = calor).

Hice las medidas fotométricas de la luz visible en cuanto a intensidad, aplicando el método para hallar el Ascendente gradienta en lugar del astronómico, y se observa que el correspondiente desvío va aumentando conforme aumenta la Latitud geográfica, y que los valores hallados en las cartas concuerdan con gran precisión con los calculados mediante este sistema; y no solo esto, sino también respecto a su posición del Ascendente en Signo, por ser distinto el desvío según los diferentes puntos del círculo.

Una primera consecuencia ha sido comprobar que es justamente la luz, y menos el calor, lo que influye en el hombre, concordando con la misma observación constatada en biología de que los relojes biológicos tienden a apoyarse en la luz y no en el calor, al objeto de mantener su invariancia respecto al medio ambiente⁵.

Nótese que, históricamente, ya San Cipriano se refiere a que algunos explicaban en su tiempo la influencia de los astros mediante el calor, pero, los más doctos, por la luz.




Figura 3

4.- De los hechos anteriores nacen los siguientes principios astrológicos⁶:

⁵ El mamífero (termorregulado) responde preferentemente a la luz, el reptil / insecto (poiquiloterma) al calor.

⁶ Lo analítico responde más directamente al concepto de causa-efecto que lo estadístico, que solo da correlación.

1) Los astros y el inmediato ambiente local forman el influjo básico sobre el ser viviente (principio antrópico).

2) El principal influjo proviene de la luz y el calor⁷, y en organismos superiores, sobre todo, la luz, por su intensidad y cromatismo. La importancia de un influjo cualquiera se puede medir por el tiempo de supervivencia cuando este influjo se suprime⁸.

3) Cada estructura biológica sintoniza, o tiene resonancia, en su propia frecuencia / período: lo molecular / celular en el espectro luminoso, lo orgánico en los distintos fotoperíodos que sintonizan con su evolución.

4) El gradiente de radiación determina la actividad orgánica, y el sistema afectado corresponde al espectro de la misma⁹.

5) Una vez formado el conjunto biológico, éste se independiza hasta cierto grado de su ambiente, y comienza sus propios ritmos, aunque ligados al exterior, y, para sobrevivir, ha de sincronizar los internos con los externos. Ello es debido al fenómeno de acumulación o dosis.

5.- Consecuencias:

Del Principio 1º se deduce que interviene la composición de la atmósfera (vapor de agua y gases) que influyen en la absorción y el espectro final resultantes; igualmente, influyen la geología y vegetación local en las diversas épocas del año.

Del Principio 2º vemos que el astro y su influencia dependen de:

A) Su altura h respecto al Horizonte, pues con ella varía la absorción, el ángulo de incidencia sobre el suelo, y su espectro.

B) La posición zodiacal del astro, que va unida a su declinación, y por esto de la máxima altura meridiana del mismo, que nos lleva de nuevo al punto A.

C) La posición del astro respecto al Sol, centro del sistema y zona más densa en gases y en partículas, que absorben ciertas longitudes de onda y modifican su espectro. Asimismo, y por estar esto relacionado con su distancia a la Tierra, la mayor o menor intensidad de su radiación y su cromatismo¹⁰.

Del Principio 3º se deduce que a una variación del espectro (por efecto atmosférico u otro) corresponde una influencia en distintas estructuras afectadas por el mismo, y de aquí mismo las orgánicas correspondientes¹¹.

⁷ A medida que Demetrio Santos fue profundizando en sus investigaciones, añadió un influjo decisivo sobre los ecosistemas terrestres y los seres vivos: la radiación γ . Nota del compilador.

⁸ La mayor energía de formación de la estructura proporciona mayor estabilidad = perfección.

⁹ Son interdependientes gradiente y fotoperíodo, como es fácil deducir.

¹⁰ Todo influjo fotoperiódico depende del tiempo, y los armónicos biológicos se apoyan en éste, por eso, los armónicos de las Ecuaciones Fundamentales (ver *Astrología Teórica*) se aplican a ello, y se deducen los aspectos y puntos críticos.

¹¹ Galeno da prioridad a la velocidad del astro sobre la intensidad de su luz (por ejemplo, en la Luna), lo que implica el predominio de la influencia molecular / celular sobre la orgánica en la patología de un sistema.

Del Principio 4º, la intensidad y gradiente cromáticos varían para un mismo planeta por las consideraciones antedichas, y asimismo al ser reflejadas o absorbidas por el suelo local¹².

Del Principio 5º deriva la existencia de un receptor, que es el organismo ya independiente, y un emisor, que es el ambiente general creado por la radiación externa. Astrológicamente se corresponden con las direcciones, basadas en la propia evolución individual y sus relojes biológicos, y los tránsitos, ambiente creado por los astros en su movimiento.




Figura 4

6.- Por el principio 4º es reemplazado el Ascendente astronómico por el Ascendente gradiente (Fig. 4), que significa la variación máxima diaria de la luz que llega al suelo local. De este modo, todos los astros, incluidos los circumpolares, tienen un punto de máxima variación positiva (Ascendente), incluso los que nunca salen o se ponen para ese lugar de la Tierra, y se pueden ubicar respecto a esta coordenada.

Por esta misma razón, cualquier punto de la Tierra, incluidas las zonas polares, tiene su Ascendente. El error, en las Casas tradicionales, ha sido el apoyarse en el Ascendente astronómico, que es una coordenada de posición, pero no de influencia.

Hay que advertir asimismo que el valor gradiente varía entre el máximo en el Ecuador y el valor cero en los Polos, y ello nos da el valor en importancia del astro, según su declinación, para un valor dado (Fig. 3).

¹² Cuando el Sol sale o se pone, aparece o desaparece la luz del astro, y se da el máximo gradiente negativo o positivo. Ello explica las partes arábicas y su cálculo como puntos del cielo de máximo gradiente del astro en cuestión.

7.- Del Principio 5° y su acumulación o dosis resultan importantes consecuencias:

A) Cada organismo (especie biológica, individuo, etc.) sintoniza un espectro y fotoperíodos peculiares y propios (dependiente de su historia genética, individual y topológica).

B) Un mismo organismo cambia a medida que recibe nuevas dosis (acumulación, memoria, evolución) y varía su sintonía según su fase vital. Ello se había observado ya por los antiguos, quienes habían establecido una regencia planetaria por edad¹³.

C) Si cambian a largo plazo las condiciones externas y el organismo sobrevive en ellas, es porque ha cambiado estructuras, lo que nos lleva a su adaptación por Latitud geográfica. Pues al cambiar de Latitud, ésta influye en la altura del astro h sobre el horizonte, la incidencia de sus rayos, la absorción atmosférica, etc., ya citados, y el organismo ha de calibrarse para el clima medio allí existente (cromatismo, intensidad, fotoperíodos) con mecanismos complementarios adecuados, que establecen nuevas referencias para su actividad allí.

Por ejemplo, un ser viviente habituado a vivir a los 20° de Latitud en el Hemisferio Norte, cuando se traslada a los 60°, acomoda sus relojes biológicos a esta nueva latitud. Si antes el Sol alcanzaba la luminosidad correspondiente a una altura meridiana de 70°, ahora solamente llegará a los 30°, y el organismo ha de tomar éstos como referencia y unidad de medida para este clima, y no los valores absolutos lumínicos.

Matemáticamente, la función de luminosidad $f(I)$ ha de afectarse de una corrección mediante el factor $\cos L$, es decir, será $f(I) \cdot \cos L$ lo que nos indique sus efectos y las nuevas coordenadas de referencia luminosas tomadas por el organismo. Por eso, las variaciones en declinación de la Eclíptica (Zodiaco) por donde circulan los planetas, también vendrá afectada por dicha corrección, y ello reflejará la adaptación orgánica en general¹⁴. Puesto que los valores de esta curva nueva referidos a la Eclíptica, tratan precisamente de luz, la llamamos **Fotoeclíptica**.

¹³ Realmente, los armónicos operan dentro del organismo (Principio 5°) como ciclos de evolución. Éstos son muy complejos, unos de período constante y otros de período variable, debido al crecimiento del organismo (regencias planetarias por edad). Estos últimos responden en primera aproximación a la serie de Fibonacci (función acumulativa), y se manifiestan en ejemplos como la Bolsa de valores y curva de Elliot, como actividad humana.

¹⁴ Aunque aparentemente sencillo, el coeficiente de corrección por latitud $\cos L$ se ajusta bien a la observación hasta los 85°. Veamos, por ejemplo:

Latitud	$\cos L' / \cos L$
5°	0,964
30°	0,970
60°	0,982
70°	0,962
80°	0,962
85°	0,962

Habida cuenta que L' indica la Latitud que corresponde a la iluminación media (quanta diarios).

8.- Las divisiones de Casas tradicionales se apoyan en las coordenadas astronómicas: **Eclíptica**, **Horizonte** y **Meridiano** y sus intersecciones. Pero si se quiere establecer un sistema influencial (biológico), éste ha de apoyarse en coordenadas influenciales: **Fotoeclíptica**, **Horizonte gradiental** y **Meridiano gradiental**, correspondientes a las anteriores (Fig. 5).




Figura 5

El **Meridiano gradiental** es la línea celeste, entre ambos polos, con máxima intensidad y gradiente cero, que es una curva y tampoco coincide con el meridiano astronómico, por efecto asimismo de la atmósfera, que lo desplaza a unos grados después del paso del astro por el meridiano. Hay actualmente pocos datos experimentales para situarlo¹⁵.

Sin embargo, el sistema de casas influencial es algo interno, producido en el propio organismo en función de sus ritmos y relojes biológicos (Principio 5º) y podemos aplicarle un sistema de división domal mediante los puntos críticos que derivan de un campo zodiacal temporal (ver *Astrología Teórica*) que se apoye en el Ascendente gradiental y su intersección con la fotoeclíptica.

Debido a la irregularidad y singularidad del gradiente esférico¹⁶, las cúspides domales de las Casas opuestas no estarán ahora a 180º entre sí, sino

¹⁵ Hay que advertir que los Aspectos derivan del período diario al paso del astro por el Meridiano, y no por el Ascendente

¹⁶ Los usos en la esfera celeste que resulta se observaron ya en las antiguas faces tales como aparecen en Ben Ezra (*Initium sapientiae*), por ejemplo (faz = fascia, latín = faja celeste).

3ª faz de Aries: Casiopea
Cabeza de diablo
Triángulo
Cabeza y cuerno de Aries

que serán opuestas en fase y distantes entre sí un semiperíodo, ya que el organismo no es un campo espacial uniforme y homogéneo. Su única invariante es el tiempo, y de ahí la referencia a esta coordenada y no al espacio. Por esta causa, hay que expresar individualmente la posición de todas las Casas, de la 1ª a la 12ª, con sus valores, derivados de los puntos críticos del campo.

9.- Las Casas se apoyan en el Ascendente porque fija el principio del ciclo diario, y los demás ángulos tienen menos influencia.

Podemos explicarlo así. Si el ritmo circadiano del hombre es de 16 horas de vigilia y 8 horas de sueño, esto se mantiene con independencia del exterior (Principio 5º), y su ritmo dependerá durante el día del momento en que despierte. Al cabo de 16 horas estará fatigado, y dormirá las restantes 8 horas. Si despertó con la salida del Sol, descansará antes del ocaso cuando el día es más largo, y después de él cuando es corto, y la puesta de Sol o llegada de la noche influirá poco en él, menos que el momento en que despertó.

Igualmente, si una planta anual tiene un ciclo vital de 5 meses, y brota en febrero debido a unas circunstancias propicias, morirá en julio; pero si por otras circunstancias brota en marzo, fenecerá en agosto, y de nada servirán riegos u otros cuidados para mantener su verdor. Se observa que el ritmo propio predomina sobre las demás circunstancias externas.

Por ello utilizamos en este sistema de Casas temporales (con referencia individual y no astronómica) que se apoyan en el Ascendente gradienta, es decir, en el punto de máxima influencia del ciclo diario. Los demás ángulos y puntos medios del espacio sirven para cualificar la Casa correspondiente en que se ubiquen en este sistema, pero no son determinantes como lo es el Ascendente.

10.- Para calcular analíticamente las cúspides de las Casas hemos partido de la curva general fotométrica C. A. N. obtenida experimentalmente y mediante cálculos teóricos.

Las fórmulas de transformación tienen como datos la citada C. A. N. y el punto de la fotoeclíptica, con su velocidad y trayectoria respecto al


Hilo de Piscis

2ª faz de Escorpio:	Mano de la Osa Menos Extremo cola del Dragón Corona Boreal Libra, testículos y pie. Corona de Escorpio.
2ª faz de Capricornio:	Final de Osa Menos Dragón Ala derecha y cuello del cisne Cuerpo del Águila Cuernos y Cabeza de Capricornio Borde de Sagitario

Horizonte; de este modo se calcula el punto de gradiente máximo, que es el Ascendente fotoeclíptico.

En la Tabla simplificada que ofrecemos, se han tomado muestras cada 5° para Latitud y Declinación para el Ascendente, y se entra en la Tabla con la hora sidérea (T. S.) como en las tablas tradicionales.

En las Casas (Tabla de 35° de Latitud, como ejemplo) se observa un equilibrio en cuanto a la extensión máxima y mínima de las Casas, cosa que no sucede en los sistemas tradicionales, donde en latitudes altas acaban reduciéndose unas a cero y otras ampliándose hasta medio círculo. Es por ello que se pueden aplicar en las mismas condiciones a zonas polares (Fig. Ejemplo 7-7).



11.- Al estar basadas en datos influenciales, las Casas fotoeclípticas han de representar la evolución biológica individual, y nuevamente nos encontramos con el ciclo de 60 años y la evolución del hombre. Si la Casa 4ª corresponde a la edad de la pubertad (14 o 15 años), el movimiento del vector direccional llegará a su cúspide, partiendo del Ascendente, hacia dicha edad; se puede adelantar o retrasar algo, pero no excesivamente. Esto es justamente lo que nos dice la distribución domal fotoeclíptica en la Casa 4ª respecto a su distancia al Ascendente, porque el individuo humano tiene la pubertad como resultado de su propia evolución, y no por efecto exterior de los astros.

T. S. H. min.	Latitudes																
	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°
0 00	25 17	26 17	28 17	1 5	2 5	4 5	6 5	7 5	8 5	9 5	10 5	10 5	10 5	9 5	7 5	4 5	26 17
0 20	29	1 5	3 5	5	6	9	10	12	12	14	15	15	14	14	11	9	1 5
0 40	4 5	6	8	9	11	14	15	15	17	19	20	18	18	19	16	13	6
1	9	10	13	14	16	19	19	20	21	23	24	22	22	23	20	18	11
1 20	14	15	18	18	20	23	24	25	25	27	29	27	27	27	24	23	16
1 40	18	20	22	23	24	28	28	29	1 1	1 1	3 1	1 1	1 1	1 1	29	27	20
2	22	25	27	28	29	2 1	2 1	3 1	6	5	7	5	5	5	3 1	2 1	24
2 20	27	29	1 1	2 1	3 1	6	7	8	10	9	10	10	10	9	7	6	28
2 40	2 1	4 1	6	7	8	10	11	12	14	13	14	14	14	13	12	9	3 1
3	7	8	10	12	13	14	15	17	18	18	18	18	18	17	16	13	7
3 20	12	13	16	17	17	18	20	21	22	22	22	22	22	22	21	20	18
3 40	17	18	21	21	22	23	24	25	26	26	26	26	26	25	25	24	21
4	22	23	25	26	27	28	28	29	0 1	0 1	0 1	0 1	29	28	25	24	19
4 20	27	28	0 1	0 1	1 1	2 1	3 1	4 1	4	4	4	4	3 1	2 1	1 1	28	23
4 40	2 1	3 1	5	6	7	8	8	9	8	8	8	7	6	5	4	2 1	26
5	8	10	10	10	11	12	12	13	13	12	12	12	11	9	8	6	0 1
5 20	13	14	15	15	15	15	17	16	17	16	16	15	15	13	12	10	4
5 40	19	19	20	20	20	20	21	20	21	20	20	19	19	17	16	13	8
6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	24	24	23	23	21	20	17	11
6 20	0 1	0 1	0 1	0 1	29	29	29	29	28	28	28	27	26	25	24	20	15
6 40	5	4	5	4	4 1	3 1	4	4 1	3 1	2 1	1 1	1 1	0 1	28	28	24	20
7	10	10	10	9	9	8	8	7	6	5	4	4	4	2 1	2 1	24	20
7 20	16	16	15	14	13	13	13	12	12	10	9	8	7	5	4	1 1	23
7 40	21	20	19	19	18	17	17	16	16	14	13	12	12	11	8	5	2 1
8	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	16	15	11	9	5
8 20	2 1	1 1	29	28	27	27	25	24	23	22	21	20	20	18	15	12	9
8 40	7	6	4 1	3 1	2 1	1 1	29	28	27	26	25	24	23	21	19	16	13
9	12	11	9	8	6	5	3 1	2 1	1 1	0 1	29	28	26	24	23	20	18
9 20	17	16	14	12	11	10	8	7	6	4	3 1	2 1	0 1	28	27	24	22
9 40	22	20	18	17	15	14	13	11	10	8	7	6	4	2 1	1 1	28	26
10	27	25	23	21	20	18	17	15	14	12	11	10	8	6	5	1 1	0 1
10 20	1 1	0 1	28	26	24	23	22	19	18	16	15	14	11	10	8	5	4
10 40	5	4	2 1	0 1	28	27	26	23	22	20	19	18	16	13	12	9	8
11	10	9	7	5	3 1	2 1	0 1	28	26	25	23	22	20	17	16	13	12
11 20	15	13	11	9	7	6	4	2 1	1 1	29	27	26	23	21	20	17	16
11 40	20	18	16	13	12	10	8	7	5	3 1	1 1	0 1	27	25	24	22	19

TABLA GRADIENTAL: Posición del Ascendente fotoeclíptico (de 5° en 5°)

Lo mismo podemos ver respecto al matrimonio y su regencia por la Casa 7ª, donde, por su variación fotoeclíptica, se puede adelantar o retrasar, pero no llega en todos los individuos a la misma edad, tal como ocurre en las tablas tradicionales, donde la 7ª es exactamente opuesta a la 1ª, y así todos los individuos tendrían su problema matrimonial a los 29 años (ciclo de 60 años), lo cual no refleja la realidad (ej: Tablas).

El desvío del Ascendente, que es grande para latitudes altas¹⁷, puede también comprobarse mediante el ciclo de 60 años, y se ajusta bien en los horóscopos que hemos estudiado personalmente, y solo por este procedimiento tiene explicación, ya que varía según su ubicación en los distintos Signos.

Estas son algunas de las consecuencias obtenidas hasta el momento, y que esperamos sean ampliadas por aquellos que sigan esta vía de investigación, que creemos prometedora.

¹⁷ Los desvíos observados, comparados con los teóricos son:

(30°) Ptolomeo / Demófilo	(40°) España	(50°) Europa C. (Gauquelin)
Observados: 5°/6°	6°/7°	8°/10°
Teóricos medios 6,5°	6,7°	8,3°